

PAR UNE ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION DÉVELOPPEMENTALE DE LA SÉMIOLOGIE ENFANTS - ADULTES

Jean-Marc SCHOLL, Paule PHILIPPE, Centre de Ressources Autisme Liège, BELGIQUE

Introduction

	Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (ADHD, TDA/H)	Trouble bipolaire	
		Type I	Spectre bipolaire
Prévalence en population juvénile	3 à 5 % (Kessler et al., 2006) (Fayyad et al., 2007)	1 % (Da Fonseca & Fakra, 2010)	6 % (de 2 à 15) (Benazzi, 2007)
Prévalence pour les adultes	1,9 à 7,3 % (Kessler et al., 2006) (Fayyad et al., 2007)	1 % (Merikangas et al., 2007)	4,4 % (Merikangas et al., 2007)
Comorbidité (Angold et al., 1999) (Carlson, 1998) (Singh et al., 2006)	Au sein d'une population d'enfants avec ADHD : présence de 11 à 22% de trouble bipolaire	Au sein d'une population d'enfants avec troubles bipolaires : présence de 57 à 98% d'ADHD	

Objectif

Affiner « une sémiologie développementale » et le diagnostic différentiel **ADHD / Bipolarité**

Méthode

Étude qualitative avec observation et « anamnèse sémiologique » détaillée d'un maximum de micro-signes.

Echantillons: **14 enfants** (5 à 10 ans) et **7 adultes** (20 à 37 ans) avec **ADHD seul**


170 enfants (2 à 10 ans) et **55 adultes** (19 à 61 ans) avec des **caractéristiques bipolaires** (selon le DSM IV).

Résultat

Proposition d'un "**tempérament maniaque bipolaire simple**" en **7 axes sémiologiques** :

1. forme super-énergétique
2. clinique du sommeil
3. "mal-être en situation d'être seul"
4. labilité émotionnelle
5. excitabilité, désinhibitions, appétences
6. prépondérance de l'attention divergente sur l'attention convergente
7. tendance à l'hyperactivité.

L'ADHD ne comporte que 1, 6 et 7.



Sur le plan sémiologique :

- ☐ La bipolarité inclut les symptômes de l'ADHD.
- ☐ Par contre, l'ADHD n'inclut pas tous les symptômes de la bipolarité.

Les symptômes communs à la fois à l'ADHD et à la bipolarité sont :

- ☐ la prépondérance de l'attention divergente
- ☐ l'hyperactivité
- ☐ la tendance à être en superforme.

Les symptômes spécifiques à la bipolarité sont :

- ☐ la clinique du sommeil
- ☐ le "mal-être en situation d'être seul"
- ☐ les couleurs affectives expressives
- ☐ l'excitabilité, les désinhibitions et les appétences.

Bipolarité : Tempérament maniaque bipolaire

