


25 25

STRATIGRAPHIE DÉTAILLÉE DU Tria  
S BASSINS ARDENNO-RHÉNANS

par M. STREEL  
Chef de travaux  
de Conférences à l'Université de Liège

ales de la Société Géologique de Belgique.  
89, 1965-66, Bull. n° 1-4  
juin 1966



Hors texte 1. — Évolution des histogrammes de fréquence de taille d'*H. lepidophytus* en fonction de leur position stratigraphique.

- 1. 1<sup>er</sup> biostrome.
- 2. Base du biostrome principal.
- 3. Sommet du biostrome principal.

Dans chaque histogramme :  
en ordonnée : nombre de spécimens par classe de taille,  
en abscisse : classes de taille (Intervalle 5  $\mu$ ).

(1) Roys. 11 : numérotation de ce banc repris de BOUCKAERT et ZIEGLER (1965, p. 17).

Hors-texte 2. — *Corrélations palynologiques entre les sondages et affleurements.*  
Numérotation des bancs, de CONIL, sauf mention contraire.  
Stratigraphie et extension des faunes d'après :

- (1) BÖGER, 1962.
- (2) BOUCKAERT et ZIEGLER, 1965.
- (3) CONIL et Coll., 1964.
- (4) MICHOT, CONIL et PIRLET, 1966.
- (5) FRANSSEN, 1965.
- (6) LHOEST et FORIR, 1895.
- (7) MOURLON, 1875.
- (8) PAUL, 1939.

s sondages et affleurements.  
n contraire.

