

Ep 12.
(+ 1211)

Extrait des *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique*

TOME XCI - 1955 - V - VI

Sur les Malacodermes paléarctiques

(17-24)

PAR

Noël MAGIS

te, Bruxelles

IMPRIMERIE DES SCIENCES, s. a.
75, Avenue Emile de Beco
BRUXELLES

Sur les Malacodermes paléarctiques ⁽¹⁾

par Noël MAGIS

(17)

17. — Présence de *Cantharis cryptica* ASHE en Belgique.

G. H. ASHE (1946) a attiré l'attention sur le fait que deux espèces étaient confondues sous le nom de *Cantharis pallida* GÆZE (*bicolor* PANZ.) et les distingua provisoirement sous l'expression *pallida* A et B par caractères suivants :

— **pallida** A : pubescence des élytres égale et couchée ; genoux postérieurs seuls obscurcis ; palpes bordés de noir ; bord postérieur de l'édéage recourbé dorsoventralement (fig. 1, loc. cit.).

— **pallida** B : pubescence des élytres moins couchée, mêlée avec des poils plus longs et paraissant de ce fait plus ébouriffé ; tous les genoux marqués de noir, les antérieurs plus étroitement ; palpes entièrement testacés ; bord postérieur de l'édéage échancré de façon à former deux lobes pointus (fig. 2 loc. cit.).

Ultérieurement (1947) il nomma la forme B *cryptica*, réservant à la forme A le nom de *pallida* (comme se rapportant plus à la description générale de GÆZE) et créant à ce propos un néotype.

Dans l'*Entomologiste* (1947) il signalait que le type B avait été signalé d'Europe Centrale (sans autre précision) sous le nom de *C. intermedia* HICH. M. G. H. ASHE qui a eu l'amabilité de m'envoyer un couple de chaque espèce comme matériel de comparaison m'a signalé *in litteris* (26 février 1953) : « As regards the note in l'*Entomologiste* the species had been recognised by a coleopterist in Austria but the fact had not been published so my name stands.

(1) Pour les notes précédentes, voir : N. MAGIS, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXXIX, 1953, p. 251 ; XC, 1954, pp. 142 et 199.

There seems no doubt that *cryptica* is the same as *intermedia* but I cannot at the moment find the correspondence ».

J'ai examiné un certain nombre d'exemplaires belges déterminés comme *pallida* et y ai reconnu la présence des deux formes. Toutefois l'existence de quelques cas « difficiles » m'oblige momentanément à réserver mon opinion sur le statut définitif de ces deux espèces ; c'est donc sous réserve que j'ajoute *C. cryptica* à la liste des *Cantharis* belges.

Cantharis pallida GÆZE (type A cf. supra) : Munster-Bilsen, 20-VI-1954, 2 ♂ (M. LECLERCQ).

Cantharis cryptica ASHE (type B cf. supra) (*intermedia* HICH. (*nom. nud.*), *pallida* GÆZE div. auct.) : Saive, V-1952, 1 ♂, 1 ♀ (L. BERNAERTS) ; Angleur (Sart-Tilman), 23-V-1953, 1 ♂ ; Bévercé, 14-VI-1953, 1 ♂, 2 ♀ ; Visé, 21-VI-1953, 1 ♀ ; Limont, 16-V-1954, 1 ex. (Ch. JEUNIAUX) ; Munster-Bilsen, 20-VI-1954, 1 ♀ (M. LECLERCQ) ; Sy sur Ourthe, 27-VI-1954, 1 ♀.

Cette espèce a vraisemblablement la même aire de distribution que celle signalée par les auteurs pour *C. pallida* s.l. ; sa présence a été signalée ces dernières années de Grande-Bretagne, de France (A. MEQUIGNON, 1948), de Hollande (P. J. BRAKMAN, 1954) et maintenant de Belgique.

*Université de Liège, Laboratoire de Biochimie
et Institut royal des Sciences Naturelles
de Belgique.*

BIBLIOGRAPHIE

- ASHE, G.H., 1946, 1947, *Entom. monthly Mag.*, LXXXII, p. 138 et LXXXIII, p. 59.
—, 1947, *L'Entomologiste*, III, n° 3-4, p. 198.
BRAKMAN, P.J., 1954, *Entomol. Berichten*, XV, n° 8, p. 181.
MEQUIGNON, A., 1948, *L'Entomologiste*, IV, n° 2, p. 110.