

## La qualité de vie et la détresse émotionnelle chez l'enfant : une étude comparative entre enfants atteints de cancer et enfants tout-venant

Fonseca Marta (1), Missotten Pierre (2), Etienne Anne-Marie (3), Dupuis Gilles (4),  
Lemétayer Fabienne (5), Spitz Elisabeth (6)

(1) Doctorante à Université Paul Verlaine-Metz (martasafonseca@gmail.com) - (2) Université de Liège - (3) Université  
de Liège - (4) Université du Québec à Montréal - (5) Université Paul Verlaine - Metz - (6) Université Paul Verlaine -  
Metz

**Objectifs:** Dans le domaine de la mesure de la qualité de vie (QdV) infantile, on peut distinguer des outils génériques, spécifiques et modulaires. L'Inventaire Systémique de Qualité de Vie pour Enfants (ISQV-E ; Missotten et al., 2007 ; Missotten et al., 2010) se présentait en tant qu'outil générique. De façon à prendre en compte tant les aspects génériques que les aspects spécifiques de la QdV des enfants cancéreux, un module «cancer» pour l'ISQV-E a été créé (Fonseca et al., 2009 ; Missotten et al., 2008). La QdV d'enfants tout-venant (N=120) est comparée avec celle d'enfants en traitements oncologiques (N=26) et d'enfants en rémission/hors traitements oncologiques (N=14). **Méthode:** Les enfants, âgés de 8 à 12 ans, ont répondu à différents questionnaires: 1) un questionnaire sociodémographique; 2) le Stait-Trait Anxiety Inventory for Children (STAI-C) de Spielberg et collaborateurs (1973) 3) le Children's Depression Inventory (CDI) de Kovacs & Beck (1977) et 4) la version portugaise de l'ISQV-E dans son format générique et modulaire («cancer»). **Résultats:** Les trois groupes d'enfants diffèrent significativement entre eux au niveau de la QdV générique, de la dépression et de l'anxiété. Les enfants tout-venant présentent une mieux QdV générique et moins de symptomatologie dépressive et d'anxiété que les enfants malades. De leur côté, les enfants en traitements rapportent une moins bonne QdV générique et des niveaux de dépression et d'anxiété les plus élevés. En ce qui concerne, la QdV modulaire, i.e., plus directement liée aux domaines de vie concernés par le cancer, les enfants en traitement évaluent de façon significativement plus négative leur QdV. **Conclusion:** Ces résultats montrent la sensibilité de la version portugaise des formats générique et modulaire de l'ISQV-E à discriminer enfants tout-venant d'enfants atteints de cancer et aussi enfants malades en traitements d'enfants malades en rémission/hors traitement.

**Mots-clés :** Qualité de Vie - Anxiété - Dépression - Enfants - Oncologie

### Références bibliographiques :

Etienne, A.-M., Dupuis, G., Spitz E., Lemetayer, F. & Missotten, P. (in press). The gap concept as a quality of life measure: Validation study of the Child Quality of Life Systemic Inventory. *Social Indicators Research*.

Fonseca, M., Missotten, P., Etienne, A.-M., Lemetayer, F. ; & Spitz, E. (2009). A modular approach to quality of life assessment in paediatric oncology. *Psychology and Health* 24(1), 175.

Missotten, P., Etienne, A.-M. & Dupuis, G. (2007). La qualité de vie infantile : Etat actuel des connaissances. *Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive*, 12(4), 16-27.